

当院で つつが虫病患者さん発生



十二月末につつが虫病の方が来院されました。

カゼのようだとということで、高熱もあったが、今は解熱してだるいという事なので、インフルエンザのテストもしましたが、()でした。

何か発疹もあるということなので、診ると変わった発疹につつが虫のらしい刺し創もありました。リンパ腺が腫れているのが気になりましたが、これだけ揃えばつつが虫病らしいので、採血をして、特効薬のミノマイシンを投与しました。二三日で軽快したそうです。



つつが虫病の特徴は

普通の風邪よりなんとなく重い感じ。

体がだるい。

刺されて1〜2週間後に発熱し38以上の高熱が続く。

発熱後3〜4日して赤褐色の発疹が出る(写真A)




頭痛、関節痛がする。

水ぶくれやかさぶた(刺し口)ができる(写真B)



リンパ節が腫れる。



予防方法

ツツガムシの幼虫は、地表面や膝位までの草などにいるので、野山やその周辺の畑に行くときは、次のことに留意しましょう。

肌の露出を避けるため、長袖・長ズボン等を着用する。虫よけスプレー(ダニ忌避剤入り)をかける。なるべく地面に寝転んだり、腰をおろさない。野山などに行った後はすみやかに入浴し、着替えをする。

患者さんよりお手紙

狩野 I 様




毎日の暑さにびっくりしたりまあいいか?夏だものと仕方ないと思ったり...いつも病院のたよりは楽しみにしております。ためになるお話しや季節ごとのお花やイラスト他の病院では見ることの出来ないものです。先生のお人柄がよく思われます。又先日胃のレントゲンの折いろいろ御心配して下さいました。ただ感謝してありがとうとお礼申し上げます。暑さがつづく折皆様充分御自愛下さって毎日お仕事にお励み下さいませ お礼まで

1月・2月の休診日

休診 日曜・祭日
午後休診 水曜・土曜

E・メールを送って下さい。
norikazu@okutu.jp



みなさんの質問や投稿をお待ちしております。
受け付けからのお願い
月初めには必ず保険証を受け付けにお出し下さい。
診察券は毎回お持ち下さい。
編集に当たり校正には十分注意致しましたが、誤字・脱字等がありましたらご容赦下さい。